

**SOULDENTAL**  
A MOSOLY SZAKÉRTŐJE

+36 30 228 3199  
info@souldental.hu  
www.souldental.hu

## FOGELTÁVOLÍTÁS - FOGHÚZÁS

### MIKOR VAN SZÜKSÉG EGY FOG ELTÁVOLÍTÁSÁRA?

Eltávolíthatunk beteg, fájdalmat okozó, vagy beteg, szubjektív panaszokat nem okozó fogakat is.

A fogeltávolítás indikációja lehet:

- A fogakból kiinduló akut, vagy krónikus gyulladás, amikor a fogat/fogakat gyökérkezeléssel, gyökércsúcs resectióval megmenteni nem lehet..
- Amikor az előrehaladott fogágybetegség miatt a fogat, fogakat menthetetlennek ítéljük.
- Traumásan sérült fogak esetében, amikor a gyökér megtartása nem lehetséges.
- Mély szuvas lézió, vagy pulpitis esetén, ha a gyökérkezelés nem kivitelezhető megfelelően, illetve a restaurációra alkalmatlan a foggyökér.
- Sikertelen endodonciai kezelés esetén, amikor további kezelésre már alkalmatlan a fog.
- Ha az áttörésben visszamaradt és számfeletti fogak funkcionálisan, vagy esztétikailag nem illeszkednek be a fogazatba.
- Amikor a fogszabályozó kezelés, vagy protetikai rehabilitáció esetében egy fog a kezelések eredményességét akadályozza.


### A KEZELÉS MENETE

A foghúzás helyi érzéstelenítésben történik, és a legmodernebb érzéstelenítő anyagoknak és technikáknak köszönhetően általában fájdalommentes.

A beavatkozás során mindössze enyhe nyomást, feszegetést érezhet.

Amennyiben mégis fájdalmat érez, kérjük jelezze!

A fogeltávolítás lebenyképzéssel, vagy anélkül, fogóval, emelővel, szükség esetén a gyökér körüli csont eltávolításával történik. Ezután a sebet esetenként óvatosan kikaparjuk, ügyelve a környező képletek épségére. A sebet nyomótamponnal és/vagy varrattal látjuk el. Varratszedésre általában 1 hét elteltével kerül sor.



## LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK

Ha a sebgyógyulás során akár napok elteltével lüktető, éles, folyamatos fájdalmat érez, esetleg általános állapota romlik, pl.: belázasodik, kérjük feltétlenül keresse fel fogászatunkat!

Mint minden beavatkozásnak, ennek is lehet kockázata. Nagyon ritkán előfordulhat az arcüreg megnyílása, az állcsont törése, ér-, idegképletek sérülése, amely vérzést és hosszan tartó zsibbadást okozhat.

## MIRE KELL FIGYELJEN A BEAVATKOZÁST KÖVETŐEN?

Az érzéstelenítés hatásának megszűnése után fájdalom, kellemetlen érzés jelentkezhetsz. Ez esetben fájdalomcsillapító tabletta szedése javasolt.

Kérjük, hogy a beavatkozás után az érzéstelenítő hatásának elmúltáig ne étkezzen, folyadékot lehet fogyasztani.

Tejet, tejtermékeket, forró, fűszeres, magvas ételeket (dió, mogyoró, tökmag, szotyola, müzli) enni, dohányozni, szeszes italt fogyasztani 48 órán keresztül nem szabad. Puha ételek fogyasztása javasolt.

A fog eltávolítása után 4-5 órán át a nyál halvány vörös lehet a sebből szivárgó vértől.

Öblögetéssel ne próbálja meg a vérzést megszüntetni, mert ha a véralvadékot kimossa a sebből, az újból vérezni kezd. Ha erős vérzést tapasztal, kérjük jöjjön vissza a rendelőbe!

A foghúzás után előfordulhat változó mértékben íny-, vagy arcduzzanat, esetleg az arc bőr kisebb fokú kékes elszíneződése. A duzzanatot csökkentheti az arc hűtésével: borogatással, illetve jegeléssel. A duzzanat a foghúzást követő 3-4. napon rendszerint elmúlik. Amennyiben mégsem, kérem jelentkezzen a rendelőnkben!

Elképzeltető, hogy szükség lesz antibiotikum és fájdalomcsillapító szedésére, az orvos utasítása szerint.

Az érintett területet 24 óra elteltével puha sörtéjű fogkefével lehet tisztítani, azonban nem szabad a fogkefével a sebbe nyúlni, öblögetni, szivogatni a fog helyét. Sokkal kisebb a komplikáció esélye, ha a foghúzás után is tökéletes szájhigiénét tart fenn.

