

SOULDENTAL
A MOSOLY SZAKÉRTŐJE

+36 30 228 3199
info@souldental.hu
www.souldental.hu

IMPLANTÁCIÓ – FOGBEÜLTETÉS

A KEZELÉS MENETE

Kérjük a műtétet megelőzően étkezzen, mert legközelebb csak az érzéstelenítő hatásának elmúltával lesz alkalma rá!


Az eljárás helyi érzéstelenítésben történik, és a legmodernebb érzéstelenítő anyagoknak és technikáknak köszönhetően általában fájdalommentes. Amennyiben mégis fájdalmat érez a beavatkozás alatt, kérjük azonnal jelezze!

Az implantációs műtét során a beültetendő titán implantátumot a csontba illesztjük. A műtétet a varratok behelyezésével fejezzük be.

Egyéni elbírálás alapján az implantátum gyógyulhat íny alá bezárva, ilyenkor egy második lépésben az implantátum felszabadítására kerül sor. Ebben az esetben egy gyógyulási csavar kerül behelyezésre, amellyel formázni tudjuk az implantátum körül az ínyt. Amennyiben a gyógyulási csavar kilazul, vagy kiesik, kérjük haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát. Más esetekben az implantációval egy időben kerül a gyógyulási csavar behelyezésre.

LEHETSÉGES MŰTÉTI KOCKÁZATOK

Mint minden műtétnek, az implantációnak is lehet kockázata. Nagyon ritkán előfordulhat az ér-, idegképletek, és az arcüreg sérülése, az implantátum körüli szövetek gyulladása, ha pedig a csontosodási folyamat nem megfelelően zajlik, az implantátum elvesztése. Ebben az esetben is lehetőség van újabb implantátum beültetésére, a helyreállító műtétek, és azok gyógyulási idejének elteltével. Az implantátum gyógyulási ideje alatt ragasztott ideiglenes pótlás hordását preferáljuk, a kivehető pótlások a műtött területre gyakorolt nyomással csontfelszívódást okozhatnak.



TEENDŐK A MŰTÉTET KÖVETŐEN

Kérjük, hogy a beavatkozás után az érzéstelenítő hatásának elmúlásáig ne étkezzen, folyadékot lehet fogyasztani.

A műtét után előfordulhat változó mértékben fájdalom, íny- vagy arcduzzanat, esetleg az arcbőr kisebb fokú kékes elszíneződése. Ezek a műtétet követő néhány napon belül elmúlnak.

Fontos a terület hűtése. Ennek menete: az arcbőrt krémmel be kell kenni, majd hűtőzsleszt rongyba csavarni, és 5 percre az arcbőrrre tenni, majd 5 percenként ismételni.

Elképzelhető, hogy szükség lesz antibiotikum és fájdalomcsillapító szedésére, erről a műtét után a kezelőorvos tájékoztatni fogja. Az antibiotikum mellé érdemes probiotikumot is fogyasztani, az esetleges emésztőszervi mellékhatások miatt.

Két hétig a területet csak öblítéssel, vagy puha (sebészi) fogkefével szabad tisztítani.

Sokkal kisebb a műtét utáni komplikáció esélye, ha a műtét után is tökéletes szájhigiénét tart fenn. Naponta kétszer a fogmosást követően öblögessen *Curasept ADS 220* oldattal! Az oldatot töményen használja, öblögessen vele legalább 1 percig, majd azt követően már ne öblítse ki a száját!

A varratok eltávolítására a beavatkozást követően 7-14 nappal kerül sor. Bizonyos esetekben ezen felül sebtisztításon, kontrollon szükséges megjelenni.

Az implantációt követő napokban puha ételek fogyasztása javasolt.

GARANCIA

Implantátumainkra 10 év garanciát biztosítunk! A garancia érvényességének meghatározó feltételei közé tartozik a fogmű rendeltetésszerű használata, a kezelőorvos utasításainak betartása, a megfelelő szájhigiénia fenntartása, illetve a félévenkénti szájhigiénias kezelésen való részvétel.

Szükséges továbbá a hat havonta esedékes kontrollvizsgálaton való megjelenés, és évente a röntgenkontroll elvégzése.

A *Nobel Biocare*[®] cég *Replace* valamint az *Alpha Bio* implantátumait használjuk, amelyek a világ egyik legmegbízhatóbb és legjobban dokumentált termékei.

